Plan 2026 - Alssund Biavlerforening - Skolebigården

Version: 0.6

December 2025

Varroabehandling: Udfør oxalsyredrypbehandlingen før 1. januar.

Januar - Februar - Marts

Måling af varroanedfald: Ved hjælp af indskudsbakken tælles nedfaldet én gang om ugen. Resultatet noteres.

April

Kontrollér, at alle dronninger er mærket. Dette gør det lettere at finde dronningen i forbindelse med indespærring eller fangstkassette i juni.

Måling af varroanedfald: Ved hjælp af indskudsbakken tælles nedfaldet én gang om ugen. Resultatet noteres.

Udskæring af droneyngel: Droneramme indsættes.
https://www.varroa.dk/varroa-viden/vejledninger/droneyngelfjernelse/

Maj

Måling af varroanedfald: Ved hjælp af indskudsbakken tælles nedfaldet én gang om ugen. Resultatet noteres.

Udskæring af droneyngel: Regelmæssig udskæring af droneyngel kan fjerne op til 50 % af miderne pr. forår.

Juni

Måling af varroanedfald: Ved hjælp af indskudsbakken tælles nedfaldet én gang om ugen. Resultatet noteres.

Varroa-vask: Vi tager en prøve af bier fra yngellejet. Bierne vaskes i alkohol eller en lignende væske, så eventuelle varroamider falder af og kan tælles. *På den måde kan vi sammenligne resultatet med det varroanedfald, vi registrerer i stadet.*

Udskæring af droneyngel: Regelmæssig udskæring af droneyngel kan fjerne op til 50 % af miderne pr. forår.

Honninghøst: Efter honninghøsten gemmes udvalgte udslyngede rammer til brug ved indespærringskassette.

Biologisk varroabekæmpelse:

- **Total yngelfratagelse** - velegnet til aflæggere. Varroa fjernes fra familien. Husk at behandle de nye aflæggere.
- **Dronningindespærring** - efter at ynglen er krøbet, benyttes en fangstramme. Når denne er forseglet fjernes rammen og omsmeltes.
- **Indespærringskassette** - Arbejderbierne bliver i familien. Varroa fjernes, når de forseglede rammer fjernes og omsmeltes.

Udvælgelse af familier til biologisk varroabekæmpelse

I skolebigården vil der hvert år blive udvalgt enkelte bifamilier til biologisk varroabekæmpelse. Formålet er at afprøve metoderne i praksis og give medlemmerne konkret erfaring med teknikkerne.

Der er samtidig fokus på produktion af aflæggere, og biologisk bekæmpelse planlægges, så den understøtter dette.

De udvalgte familier anvendes til demonstration af fx dronningindespærring, indespærringskassette og total yngelfratagelse. Erfaringerne skal gøre det muligt for medlemmerne efterfølgende at gennemføre metoderne sikkert og korrekt i egne bigårde.

Juli

Måling af varroanedfald: Ved hjælp af indskudsbakken tælles nedfaldet én gang om ugen. Resultatet noteres.

Udskæring af droneyngel: Regelmæssig udskæring af droneyngel kan fjerne op til 50 % af miderne pr. forår.

Varroa-vask: Vi tager en prøve af bier fra yngellejet. Bierne vaskes i alkohol eller en lignende væske, så eventuelle varroamider falder af og kan tælles. *På den måde kan vi sammenligne resultatet med det varroanedfald, vi registrerer i stadet.*

August

Måling af varroanedfald: Ved hjælp af indskudsbakken tælles nedfaldet én gang om ugen. Resultatet noteres.

Varroa-vask: Vi tager en prøve af bier fra yngellejet. Bierne vaskes i alkohol eller en lignende væske, så eventuelle varroamider falder af og kan tælles. *På den måde kan vi sammenligne resultatet med det varroanedfald, vi registrerer i stadet.*

Honninghøst: Efter sidste honninghøst er det muligt at behandle med thymolstrimler. Behandling overvejes kun, hvis varroatrykket fortsat er for højt efter biologisk bekæmpelse.

September

Måling af varroanedfald: Ved hjælp af indskudsbakken tælles nedfaldet én gang om ugen. Resultatet noteres.

Ud fra noterne kan man kontrollere, hvor meget reinvasion der finder sted.

Oktober-November

Måling af varroanedfald: Ved hjælp af indskudsbakken tælles nedfaldet én gang om ugen. Resultatet noteres.

På baggrund af resultaterne besluttes det, om der skal gennemføres en oxalsyredrypning i december. Særligt efter et varmt efterår er denne kontrol og beslutning vigtig.

December

Måling af varroanedfald: Ved hjælp af indskudsbakken tælles nedfaldet én gang om ugen. Resultatet noteres.

Oxalsyredrypbehandling: Hvis der i denne periode stadig tælles mere end 5 mider pr. dag (reinvasion), dryppes maksimalt 35 ml pr. fuldvoksen bifamilie.
Familien følges særligt nøje i det efterfølgende forår.
